TEP au ^{18}F FDG et Cancers Bronchiques

Eric ZERBIB

CIMEN,

Centre Chirurgical Val d 'Or,
92210 Saint-Cloud

eric.zerbib@cimen.fr

F-18

Principe de l'imagerie TEP

- ^{18}F : isotope radioactif produit par un cyclotron
Demi-vie : 110 min
- Annihilation du positron avec un électron et émission de 2 photons de 511 keV

Caméra hybride TEP-TDM

Détecteur TEP

Anneau TDM

Acquisition des images

Transmission

Emission

Images TEP - ^{18}F -FDG

Fusion TEP-TDM

Sans correction d'atténuation

Avec correction d'atténuation

Images de fusion TEP-TDM

The screenshot displays a medical software interface for PET-CT fusion. The main window is titled "Patient: Gemini16, Melanoma" and "MRN: sl25". The interface is divided into several panels:

- Top Panel:** Contains navigation icons (Setup, Fusion, Contours) and a menu bar (File, Options, Utilities, View).
- Left Panel:** Shows three axial slices of the chest. The top slice is a CT scan with Z-coordinates from -141,000 to -139,500. The middle and bottom slices are PET-CT fusion images, labeled "Oblique thick slice, (2) Melanoma".
- Center Panel:** Displays a grid of images. The top row shows a full-body PET-CT fusion image, a PET-CT fusion image with a thick slice, and a PET-CT fusion image with a thick slice. The bottom row shows a sagittal CT scan, a sagittal PET-CT fusion image, and a sagittal PET-CT fusion image with a thick slice. The Y-coordinates for the top row are -2,578 to -1,289, and the X-coordinates for the bottom row are 0,469 to 1,758.
- Right Panel:** Features a large PET-CT fusion image of the torso, a color scale bar, and a "Window / Level" control. The "Window / Level" control is set to 6942 and 0. Below this are "Units" (Raw), "Ramp" (Linear), and "Alpha Blending" (50) settings. There are also "Synchronize Windows" and "De-Synchronize Windows" buttons.

The interface includes various navigation and control elements, such as "undo", "redo", and "Fast MIP" / "Surface/MIP" options.

SUV

(Standardized Uptake Value)

- ❖ Analyse + objective du taux d'utilisation du FDG
- ❖ Alternative aux méthodes compartimentales
- ❖ Hypothèses:
 - mesure suffisamment tardive / à l'injection
 - concentrations dans les 3 cpmts = équilibre
 - intégrale de la $C_{\text{plasmatique}} \propto$ dose injectée

$$\text{SUV} = \frac{C_i^*(\tau)}{\text{dose/poids}}$$

- ❖ Normalisations à la masse maigre, à la glycémie, à la **surface corporelle...**

Les traceurs TEP

Le FDG-(18F)

¹⁸F-fluorodésoxyglucose
= analogue radioactif du glucose

Cellule cancéreuse

consommation de glucose ↗ (transporteur
activité enzymatique)

Distribution dans l'organisme

Le ^{18}F -FDG :

- ❖ Accumulation du ^{18}F -FDG dans les cellules tumorales....
MAIS :
- ❖ Certaines tumeurs peuvent ne pas fixer le ^{18}F -FDG
- ❖ Les tissus inflammatoires ou les sites infectieux peuvent fixer le ^{18}F -FDG
- ❖ L'étude du cerveau n'est pas possible avec le ^{18}F -FDG

TEP au 18FDG et Cancers Bronchiques

Fixation des cellules cancéreuses :

❖ Fixation corrélée

- aux transporteurs trans-membranaires du glucose
- à la prolifération cellulaire
- faible corrélation avec la densité cellulaire
- à la différenciation cellulaire (fixation plus importante pour les adénocarcinomes faiblement différenciés)

❖ Facteurs limitant la fixation

- ① L'histologie Fixation croissante : bronchiolo-alvéolaire < adénocarcinome < épidermoïde. Fixation faible : tumeur carcinoïde
- ② La taille : 192 cancers T1 $\Rightarrow$ 9 FDG - (5%) dont 3 lésions < 5 mm $\Rightarrow$ plus petite lésion visible en FDG : 5 mm

(Marom E., Radiology. 2002)

TEP au 18FDG et Cancers Bronchiques

Fixation des cellules non cancéreuses :

- ❖ Fixation des cellules inflammatoires activées en particulier les polynucléaires neutrophiles et les macrophages, par augmentation du transport intracellulaire du glucose

Lésions non malignes hyperfixantes :

- * Infectieuses : (Abscess à pyogène et pneumopathie bactérienne, Tuberculose et mycobactérie atypique, Histoplasmosse, Actinomycose, Aspergillose)
- * Inflammatoire : (Anthracose, silicose, Sarcoidose, Polyarthrite rhumatoïde, Lésions post-radiques)
- * Tumeurs bénignes : (Carcinoïde typique, Hamartochondrome, etc...)

RATIONNEL

Situations cliniques :

- ❖ Découverte d'un nodule pulmonaire isolé
- ❖ Bilan pré-opératoire d'un cancer broncho-pulmonaire
- ❖ Evaluation thérapeutique

TEP au 18FDG et Cancers Bronchiques

Situations cliniques :

- ❖ Découverte d'un nodule pulmonaire isolé
- ❖ Bilan pré-opératoire d'un cancer broncho-pulmonaire
- ❖ Evaluation thérapeutique

Nodule Solitaire

Critères diagnostiques :

- ❖ *Appréciation de la captation par rapport au médiastin*
- ❖ *Calcul du SUV (pathologique si $> 2,5$)*
- ❖ *Avec les 2 critères : Se = 95 % et Sp = 80 %*

Rohren E et al, Semin Nucl Med 2004, 2, 134-153

Nodule solitaire

Caractérisation tissulaire :

- ❖ Valeur de la biopsie +++
- ❖ La TEP au 18FDG n'est pas un examen anatomo-pathologique !!!
- ❖ L'hypermétabolisme n'est pas spécifique du cancer et l'absence de fixation n'est pas synonyme de bénignité
- ❖ Attention à la taille de la lésion

3D Volume 2
DFOV 60,6 x 138,6 cm
HD MIP No cut

S

POUMON
AM992013146.274.1183539078
Jun 06 2007

R
P

L
A

m=0,00 H=18,85 kBq/ml

I

V=3,39

Axial3 Volume 2
I: 42,7
DFOV 40,1 x 23,7 cm

A 92

POUMON
AM992013146.274.1183539078
Jun 06 2007

R
2
0
3

L
1
9
8

3,3/

m=0,00 H=11,50 kBq/ml

P 145

V=3,39

Axial4 Volume 1
I: 42,7
DFOV 40,1 x 23,7 cm

A 92

POUMON
AM992013146.274.1183539078
Jun 06 2007

R
2
0
3

L
1
9
8

3,3/

M = 1000 L = -700

P 145

V=42

Axial5 Volume 2/Volume 1
I: 42,7
DFOV 40,1 x 23,7 cm
11,50

A 92

POUMON
AM992013146.274.1183539078
Jun 06 2007

0,00

3,3/

m=0,00 H=11,50 kBq/ml

P 145

V=3,39

*Nodule
pulmonaire.*

*Adéno-
carcinome
du LSG.*

*Pas de foyer
loco-
régional ou
à distance.*

Importance de la Correction d'atténuation

Lésion spiculée au sein d'un complexe bulleux

Image obtenue avec CA

Importance de la Correction d'atténuation

Lésion spiculée au sein d'un complexe bulleux

Image obtenue sans CA

Patient de 50 ans non tabagique

TDM

TEP-FDG

Absence d'hyperfixation

⇒ **Hamartochondrome**

Adénocarcinome moyennement différencié

Hyperfixation en TEP-FDG
SUV = 3,81

Prolifération cellulaire élevée
PCNA labeling index : 62,9%
Densité cellulaire : 771 ± 90 cell/chp

Carcinome bronchioloalvéolaire

Absence d'hyperfixation
SUV = 0,84

Prolifération cellulaire faible
PCNA labeling index : 9,7%
Densité cellulaire : 905 ± 114 cell/chp

Patient de 49 ans adressé pour bilan d'extension d'une opacité lobaire supérieure gauche découverte suite à douleurs thoraciques

Tuberculose pulmonaire

TEP-FDG 3D

⇒ Nodule silicotique avec une couronne de macrophages

⇒ Carcinome épidermoïde du LIG

Lymphome de Hodgkin traité par chimiothérapie et radiothérapie
Arrêt de la radiothérapie depuis 3 mois

⇒ Lésions pulmonaires post radiques dans les champs d'irradiation

Apparition de lésions pulmonaires bilatérales
prédominantes à droite en fin de traitement d'un cancer
du sein droit (tumorectomie et radiothérapie)
Radiothérapie externe terminée depuis 4 mois

Hyperfixation intense des lésions en TEP-FDG

⇒ Lésions de BOOP post radique

TEP au 18FDG et Cancers Bronchiques

Situations cliniques :

- ❖ Découverte d'un nodule pulmonaire isolé
- ❖ Bilan pré-opératoire d'un cancer broncho-pulmonaire
- ❖ Evaluation thérapeutique

RATIONNEL

Traitement chirurgical = seul traitement curatif

Seulement 20 % des patients

(stades I, II et IIIa)

Stades	TNM	Taux de survie à 5 ans
Stade IA	T1N0M0	67%
Stade IB	T2N0M0	57%
Stade IIA	T1N1M0	55%
Stade IIB	T2N1M0 T3N0M0	38%
Stade IIIA	T3N1M0 et Tout N2M0	9 à 13%
Stade IIIB	Tout N3M0 et Tout T4M0	3 à 7%
Stade IV	Tout M1	2%

RATIONNEL

Problématiques :

- ❖ Améliorer la stadification : 70 % d'exactitude avec la c TNM (Pronostic p TNM > c TNM)
- ❖ 15 % de métastases post-opératoires

Bilan pré-opératoire Ganglions médiastinaux

Les ganglions médiastinaux : un des points fondamentaux du bilan pré-opératoire

- ❖ Seul diagnostic de certitude : histologique
- ❖ Rôle de la médiastinoscopie
- ❖ Rôle fondamental mais limité de la TDM (taille)
- ❖ Rôle de la TEP au 18FDG

Bilan pré-opératoire Ganglions médiastinaux

Fixation en fonction de la taille

Etude prospective, 54 pts,
Gold standard : histologie (168 gg prélevés)
GG + si fixation > fixation vasculaire

TEP-FDG	Se	Sp	Exact
gg < 1 cm (n=53)	80 % (n=17)	95 % (n=36)	92 %
1cm< gg <3 cm (n=107)	100 % (n=32)	91% (n=75)	95 %
gg >3cm (n=8)	100 % (n=4)	75 % (n=4)	88 %

(Gupta N., Chest. 2000)

Bilan pré-opératoire Ganglions médiastinaux

Comparaison TEP / TDM

- Etude prospective, 64 pts a priori opérables (TDM : N0, N1 ou N2) sur 92 pts (28 exclus : N3 ou M1)
- Gold standard : histologie, 1240 gg prélevés (moyenne : 19,3 gg / pt)
- TDM : hélicoïdale, injectée, coupe de 6,5 mm
gg + si > 1 cm pour le plus petit axe
- Classement des pts : N0-N1 ou N2

	Se %	Sp %	VPP %	VPN %	Ex %
TDM	55	68	23	90	66
TEP	67	85	43	93,6	82

Bilan pré-opératoire Ganglions médiastinaux

Méta-analyses:

	TEP			TDM		
(%)	Se	Sp	Ex	Se	Sp	Ex
Dwamena	79	91	92	60	77	75
Hellwig	88	92	91	65	76	73
Toloza	84	89	-	57	82	-

(Dwamena BA. Radiology 1999) : n=514 en TEP

(Hellwig D. Lebertumoren Pneumo. 2001) : n=1268 en TEP

(Toloza E. Chest 2003) : n=1045 en TEP

TEP/TDM:

(Antoch G. Radiology 2003) : n=27

Se = 89%

Sp = 94%

Ex = 93%

Bilan pré-opératoire Ganglions médiastinaux

** Anomalies ganglionnaires médiastinales en TDM :*

→ taux de FP en TEP-FDG : 15 à 20% des cas
Faux positif principalement en cas de pathologie pulmonaire associée (Konishi J., *Respiration*. 2003)

** Absence d'anomalie ganglionnaire médiastinale en TDM :*

→ si tumeur centrale, adénocarcinome ou adénopathie hilare :
taux de FN en TDM de 20 à 30%

⇒ *Si suspicion de N2 en TDM ou TEP-FDG : confirmation histologique*

(Detterbeck F., Chest 2004)

Carcinome non à petites cellules

TDM
N2

TEP
N3

Ganglions anthracosiques

- ❖ Faux positifs N2 en TDM et en TEP-FDG

Sarcoidose

Bilan pré-opératoire Recherche de Métastases

* L'existence de métastases contre indique l'intervention chirurgicale :

Rôle de la TEP :

- Dépister une métastase inconnue
- Préciser une anomalie radiologique (là encore il ne s'agit pas d'un diagnostic anatomopathologique)

EXTENSION PLEURALE

CBP et une suspicion d'extension pleurale sur les données TDM
(épanchement pleural ou épaissement pleural)

(Gupta N. , Chest. 2002) 35 pts : FDG Se = 89% Sp = 94% Ex = 91%
(Gottfried J. Radiology 2004) 92 pts: Se = 100% Sp = 71% Ex = 80%

Cancer pulmonaire
non à petites cellules

TEP-FDG : envahissement pleural
confirmé en per-opératoire

Bilan pré-opératoire Recherche de Métastases

Extension métastatique pulmonaire :

Mêmes difficultés diagnostiques que pour la caractérisation tumorale

CBP et infection

Carcinome épidermoïde du LID,
Métastase pulmonaire controlatérale prouvée histologiquement

Bilan pré-opératoire Recherche de Métastases

❖ Extension surrénalienne

+ de 20% des pts avec un CBNPC ont des métastases surrénaliennes au moment du diagnostic.

+ de 60% des pts qui présentent une masse surrénalienne avec un CBP ont des lésions surrénaliennes bénignes.

* Biopsie percutanée : faux négatif 2 à 8,6%

*Carcinome à grandes
cellules LSG
Métastase surrénalienne
prouvée histologiquement*

Bilan pré-opératoire Recherche de Métastases

* Extension surrénalienne

	Lésions	Se	Sp
<i>Boland Radiology 1995</i>	24	100% (14/14)	100% (10/10)
<i>Erasmus AJR 1997</i>	33	100% (23/23)	80% (8/10)
<i>Yun J Nucl Med 2001</i>	50	100% (18/18)	94% (30/32)
<i>Maurea J Nucl Med 2001</i>	26	100% (13/13)	100%(13/13)
Total	133	100%	94%

(Yun et al) - fixation intense $\Rightarrow$ métastase sauf si phéochromocytome

- pas d'hyperfixation $\Rightarrow$ bénin
- fixation intermédiaire $\Rightarrow$ autre exploration

Patient de 63 ans. Bilan d'extension d'un K bronchique LSD indifférencié à grandes cellules. Hypertrophie surrénalienne gauche au TDM. Hyperfixation intense et bifocale LSD et de la surrénale gauche.

Bilan pré-opératoire Recherche de Métastases

❖ Extension hépatique

TEP-FDG : pas de fixation des HNF et des angiomes

100 pts avec un CBP, 6 avec des métastases hépatiques

TEP-FDG : Exactitude = 100%

Marom E., Radiology 1999

Méta-analyse dans les cancers colorectaux, gastriques et oesophagiens
de la détection des métastases hépatiques par la TEP-FDG, US, TDM
et IRM

Pour une $Sp \geq 85\%$: $Se = 55\%$ US vs 42% TDM vs 76% IRM vs 90% TEP

Kinkel K. et al, Radiology 2002

Bilan pré-opératoire Recherche de Métastases

❖ **Métastases osseuses**

- 40% des pts avec des métastases osseuses d'un CBP sont asymptomatiques
Napoli. Radiology 1973
- 10 % des métastases post-opératoires sont localisées sur le squelette
Yano T, J Thorac Cardiovasc Surg 1994
- L'ATS et l'ERS ne recommandent pas le dépistage systématique des métastases osseuses par la scintigraphie osseuse

Bilan d'une
tumeur
pulmonaire
droite avec
suspicion de
métastases
surréaliennes

305 VoikowEUCH Metas gg, surren et os
AMS2061425.433.1183544981
DFOV 45,1 x 180,5 cm Jul 04 2007
HD HIP No cut

m=0,00 H=6,47 g¹²⁵¹ V=1,74

304 VoikowEUCH Metas gg, surren et os
AMS2061425.433.1183544981
DFOV 45,1 x 180,4 cm Jul 04 2007
HD HIP No cut

m=0,00 H=6,47 g¹²⁵¹ V=1,28

305 VoikowEUCH Metas gg, surren et os
AMS2061425.433.1183544981
DFOV 45,1 x 180,4 cm Jul 04 2007
HD HIP No cut

m=0,00 H=6,47 g¹²⁵¹ V=1,28

306 VoikowEUCH Metas gg, surren et os
AMS2061425.433.1183544981
DFOV 45,1 x 180,4 cm Jul 04 2007
HD HIP No cut

m=0,00 H=6,47 g¹²⁵¹ V=1,28

Activité hyper
métabolique
sur la lésion
pulmonaire
avec
adénopathies
médiastinales

Métastases surréaliennes bilatérales

Nombreux foyers osseux

Bilan pré-opératoire Recherche de Métastases

Extension cérébrale

Fixation physiologique du FDG : étude du
cerveau non effectuée

44 pts, 16 avec des M cérébrales

Gold standard : IRM

Lecture séparée des examens FDG et IRM

FDG : Se = 75% Sp = 83%

⇒ la taille est un facteur significatif de limitation de détection par le FDG :

Taille moyenne des lésions non détectées : 0,7 cm

Taille moyenne des lésions détectées : 2,3 cm

Rohren E., Radiology. 2003

303 Volume 2 META CEREBRALE POUND
AM#626470.508.1196678894
DFOV 45,1 x 180,5 cm Dec 05 2007
HD NIP No cut

m=0,00 H=5,98 g 1411 V=1,22

304 Volume 2 META CEREBRALE POUND
AM#626470.508.1196678894
DFOV 45,1 x 180,4 cm Dec 05 2007
HD NIP No cut

m=0,00 H=5,98 g 1411 V=1,25

305 Volume 2 META CEREBRALE POUND
AM#626470.508.1196678894
DFOV 45,1 x 180,4 cm Dec 05 2007
HD NIP No cut

m=0,00 H=5,98 g 1411 V=1,25

306 Volume 2 META CEREBRALE POUND
AM#626470.508.1196678894
DFOV 45,1 x 180,4 cm Dec 05 2007
HD NIP No cut

m=0,00 H=5,98 g 1411 V=1,25

Patient de 66 ans
opéré en 2000 d'une
lésion pulmonaire
gauche

Découverte d'une
lésion cérébrale
frontale supérieure
gauche

Recherche d'autres
localisations

303 Volume 2 META CEREBRALE POUNDN
AMC82570.508.1198878894
DFOV 45,1 x 180,5 cm Dec 05 2007
HD HIP No cut

R L
Z Z
6 6

m=0,00 H=18,09 **1411** V=1,22

304 Volume 2 META CEREBRALE POUNDN
AMC82570.508.1198878894
DFOV 45,1 x 180,4 cm Dec 05 2007
HD HIP No cut

A P
Z Z
5 5

m=0,00 H=18,09 **1411** V=1,26

305 Volume 2 META CEREBRALE POUNDN
AMC82570.508.1198878894
DFOV 45,1 x 180,4 cm Dec 05 2007
HD HIP No cut

L R
Z Z
5 5

m=0,00 H=18,09 **1411** V=1,26

306 Volume 2 META CEREBRALE POUNDN
AMC82570.508.1198878894
DFOV 45,1 x 180,4 cm Dec 05 2007
HD HIP No cut

P A
Z Z
5 5

m=0,00 H=18,09 **1411** V=1,26

Localisation
cérébrale visible en
TEP

Pas d'autre foyer en
particulier
pulmonaire
surrénalien ou
osseux

3D Volume 2
S
META CEREBRALE POUNON
AM646271770,508,1196878894
DFOV 60,6 x 138,6 cm
HD NIP No cut
Dec 05 2007

m=0,00 H=18,08 g/ml
I
V=2,96

Axial3 Volume 2
S: 263,4
DFOV 29,2 x 17,3 cm
A 135
META CEREBRALE POUNON
AM646271770,508,1196878894
Dec 05 2007

Axial4 Volume 1
S: 263,4
DFOV 29,2 x 17,3 cm
A 135
META CEREBRALE POUNON
AM646271770,508,1196878894
Dec 05 2007

Axial5 Volume 2/Volume 1
S: 263,4
DFOV 29,2 x 17,3 cm
A 135
META CEREBRALE POUNON
AM646271770,508,1196878894
Dec 05 2007

Foyer frontal gauche

TEP au 18FDG et Cancers Bronchiques

Situations cliniques :

- ❖ Découverte d'un nodule pulmonaire isolé
- ❖ Bilan pré-opératoire d'un cancer broncho-pulmonaire
- ❖ **Evaluation thérapeutique**

TEP au 18FDG et Cancers Bronchiques

Evaluation thérapeutique :

- ❖ Diminution de l'activité métabolique sur les sites tumoraux : efficacité de la chimiothérapie
- ❖ Persistance d'une activité métabolique : persistance d'une viabilité tumorale
- ❖ Attention aux délais à respecter (chimio et radiothérapie)
- ❖ Dosimétrie conformationnelle

cas clinique :

- ❖ Patiente de 72 ans présentant un syndrome tumoral pleuro-pulmonaire
- ❖ Examen réalisé le 25/7/2007
- ❖ Forte activité pleuro-pulmonaire gauche
- ❖ Adénopathie carénaire

SOUS

Evaluation thérapeutique :

- ❖ Autre plan de coupe

Après traitement :

- ❖ Examen du 12/3/2008
- ❖ Très importante diminution des foyers
- ❖ Persistance de quelques foyers

Après traitement :

- ❖ Examen du 12/3/2008
- ❖ Très importante diminution des foyers
- ❖ Persistance de quelques foyers

K petites cellules : 17 décembre 2008

- ❖ Masse hilaire droite
- ❖ SUV Max = 29,9

K petites cellules : 17 décembre 2008

- ❖ Masse hilare droite
- ❖ SUV Max = 29,9
- ❖ + localisations osseuses (humérale)

K petites cellules : 17 décembre 2008

- ❖ Masse hiltaire droite
- ❖ SUV Max = 29,9
- ❖ + localisations osseuses (cotyle)

**K petites cellules :
nouvelle évaluation
après 6 cycles de
CT**

**Examen du 30
septembre 2009**

- ❖ Disparition de la masse hilare droite
- ❖ Disparition des foyers osseux

**K petites cellules :
 nouvelle évaluation
 après 6 cycles de
 CT**

**Examen du 30
 septembre 2009**

- ❖ **Disparition de la masse hilare droite**
- ❖ **Disparition des foyers osseux**

**K petites cellules :
nouvelle évaluation
après 6 cycles de
CT**

**Examen du 30
septembre 2009**

- ❖ Disparition de la masse hilare droite
- ❖ Disparition des foyers osseux

axial Volume 1
 Ex: 4707
 S: 3
 I: 107,8
 Im: 115
 DFDV 50,0 cm
 TND

Hopital Foch
 K PC Avant CT
 A 250
 M 65 AM1654320201,655,1254299776
 Dec 17 2008

3/
 v 120
 A 30
 rot 0,80s/HE 17,5mm/rot
 0,8mm 1,75:1/3,3sep
 tilt: 0,0
 1:37:46 PM
 = 400 L = 40

P 250 V=28

Axial3 Volume 3
 Ex: 4707
 S: 4
 I: 107,8
 Im: 115
 DFDV 50,0 cm

Hopital Foch
 K PC Avant CT
 A 250
 M 65 AM1654320201,655,1254299776
 Dec 17 2008

3,3/
 3,3mm /3,3sep
 01:39:55 PM
 m=0,00 H=10,00 g/ml

P 250 V=28,55

305 Volume 3
 K PC Avant CT
 AM1654320201,655,1254299776
 DFDV 52,0 x 104,0 cm
 Weighted HD MIP No cut
 Weighted Factor Medium
 Dec 17 2008

m=0,00 H=0,45 g/ml 855 V=28,55

axial5 Volume 2
 Ex: 7082
 S: 3
 I: 107,4
 Im: 121
 DFDV 50,0 cm
 TND

Hopital Foch
 K PC Avant CT
 A 250
 M 65 AM1654320201,655,1254299776
 Sep 30 2009

3/
 v 120
 A 77
 rot 0,80s/HE 17,5mm/rot
 0,8mm 1,75:1/3,3sep
 tilt: 0,0
 8:40:36 AM
 = 400 L = 40

P 250 V=-75

Axial4 Volume 5
 Ex: 7082
 S: 4
 I: 107,4
 Im: 121
 DFDV 50,0 cm

Hopital Foch
 K PC Avant CT
 A 250
 M 65 AM1654320201,655,1254299776
 Sep 30 2009

3,3/
 3,3mm /3,3sep
 08:42:27 PM
 m=0,00 H=4,81 g/ml

P 250 V=0,80

30 Volume 5
 K PC Avant CT
 AM1654320201,655,1254299776
 DFDV 52,0 x 104,0 cm
 Weighted HD MIP No cut
 Weighted Factor Medium
 Sep 30 2009

m=0,00 H=0,45 g/ml 835 V=0,80

Les autres traceurs TEP

En oncologie :

- ❖ Prolifération cellulaire : ^{18}F -Fluoro-thymidine
- ❖ Synthèse protéique : ^{11}C -méthionine
- ❖ Hypoxie cellulaire : ^{18}F -Fluoromisonidazole
- ❖ Captation médicamenteuse : ^{18}F -Fluorouracil
- ❖ Et encore... La ^{11}C -Choline, le ^{18}F -Choline...

TEP - FDG, TEP - FLT, TEP - Choline, etc....

CONCLUSION

TEP FDG et cancers pulmonaires :

- ❖ La TEP au ^{18}F FDG doit faire partie des examens systématiques à réaliser lorsqu'un geste chirurgical est envisagé
- ❖ Bien connaître les limites de l'examen : Taille, inflammation, infection, bronchiolo-alvéolaire, etc...
- ❖ Rôle croissant en thérapeutique (suivi de chimiothérapie) et dosimétrie conformationnelle.